

Ivan Friedrich, MD • Kenneth P. Rubin, MD • Mark S. Sapienza, MD • Irina Kaplounov,
MD • Sandarsh R. Kancherla, MD • Grace H. Yang, MD

Diplomates, American Board of Gastroenterology and Internal Medicine

Modified Split Colonoscopy Prep

NOMBRE: _____ MEDICO: _____

DIA Y FECHA: _____ HORA DE EXAMEN: _____ HORA DE LLEGAR: _____

LUGAR: _____ PRESENTESE: _____

Tenga en cuenta: La poliza de cancelacion es de 24 horas. Se cobrara una multa de \$125 por cada procedimiento que seacancelado con menos de 24 horas de anticipacion.

**UNA Semana
ANTES de su
procedimiento**

- Averigue con nuestra oficina para obtener instrucciones especificas si usted toma cualquier anticoagulante (Coumadin, Pradaxa, Effient, Aspirina (Ecotrin), Eliquis, Xarelto, Plavix, etc.)
- Averigue con su medico para obtener instrucciones especificas si usted toma alguna medicina para la diabetes (Insulina, Metformin, Janumet, Glipizide, etc.)
- Obtenga su receta de Trilyte en la farmacia. Tambien tendra que comprar una botella de 10 onzas de Citrato de Magnesias (no sabor de cerezas) que se puede comprar sin receta.
- Discontinúe hierro oral 5 días antes de su cita. (multivitaminas con hierro son permitidas)

**El Dia ANTES de su
procedimiento**

- Al despertarse, COMIENZE una DIETA DE LIQUIDOS CLAROS
- NO puede consumir LIQUIDOS ROJOS (No leche ni jugo de naranja)
- Gatorade, jugos claros, agua, paletas de hielo, te y café negro estan permitidos
- A las **4-6 PM** - BEBASE la botella entera de Citrato de Magnesias
- A las **6-8 PM** - COMIENZE a tomar 2 LITROS de Trilyte durante unas cuantas horas. Si empieza a sentir nausea, tomese un receso de una hora y luego vuelva a beber la

**El Dia de su
procedimiento**

solucion de Trilyte hasta consumir 2 Litros.

Para hacer la preparacion mas facil de tolerar, use paletas de dulce (ROJASestan PERMITIDAS) y tambien ENFRIE la solucion de Trilyte en el refrigerador

- Continúe su DIETA DE LIQUIDOS CLAROS
- Descanse

- Al Despertarse, tomese todas sus medicinas regulares con un poco de agua.
- Continúe su DIETA DE LIQUIDOS CLAROS
- **5 Horas** antes de su cita: Comienze a beber 1 Litro adicional de Trilyte durante 3 horas o menos
- **2 Horas** antes de su cita: PARE de tomar liquidos – NADA! NO chicle ni dulces NO colonias, perfumes, ni lociones por favor
- Necesitara transporte para regresar a su casa NO podra guiar hasta el dia siguiente .
- Toda mujer de edad fertile sera sometida a una prueba de embarazo cuando llegue al centro.