

Barry M. Zingler, MD • Mitchell K. Spinnell, MD • Michael E. Meininger, MD • Marc A. Fiorillo, MD
Eugene S. Han, MD • Kyoung S. Baek, APN • Tatiana Valderrama, MSN, APN-BC

대장내시경(Colonoscopy) 준비사항 SUPREP- PM

성명(Name):

담당의: Dr.

예약날짜(Date):

도착시간 (Time to Register):

장소(Location):

도착보고:

유의사항: 1. 시술취소의경우 48 시간전에 알려주십시오. 시술 48 시간 이내에 취소할 경우 \$125 의 비용이 부과됩니다.

2. 뉴저지법에 따라 시술 후 마취의 영향으로 인해 반드시 운전해 주실 분이 있어야 합니다

시술 하루 전날

- 가벼운 아침식사를 오전 10 시전에 드십시오 (달걀 2 개 또는 토스트 2 장, 또는 플레인 요구르트 중 한가지).
- 오전 10 시 이후로는 모든 음식을 금하고 물이나 맑은 음료만** (가능한 많이) 계속 드십시오.
(예: 물, 사과주스, 게토레이드, 레모네이드, 하얀색의 포도주스나 크랜베리 주스, 블랙커피, 차, 소다 종류, 비타민 워터, Jell-O, 얼음 디저트 등)
- 금지 제품:** 우유나 우유 성분이 들어간 것, 오렌지 주스, 빨간색과 진한색깔의 주스

약 복용법

- 2 개의 6 온스 약병 중 한개를 믹싱용기에 붓고 물이나 맑은 음료를 용기의 16oz 선까지 부어 잘 섞어준 후 복용 준비를 합니다
 - 시술 전날 9 PM:** 섞은 약물을 모두 마신 후, 같은 용기에 16oz 선까지 물이나 맑은 음료만을 부어서 마십니다 (두 번 반복) - 섞은 약물과 두 번의 16oz 의 음료는 반드시 2 시간안에 모두 끝내야 합니다. (총 3 번의 16oz)
 - 시술 당일 AM:** 시술 6 시간 전에 1 번과 같은 방법으로 나머지 약 한 병을 타서 마신 후 같은 양의 물이나 맑은 음료만 두 번 반복합니다. 2 시간안에 모두 끝내십시오. (총 3 번의 16 oz)
- 시술 당일 4 시간전부터 물 포함, 모든 식음료를 금합니다.**