

CLENPIQ™
 (sodium picosulfate, magnesium oxide,
 and anhydrous citric acid) Oral Solution
 10 mg/3.5 g/12 g per 160 mL bottle

CLENPIQ 복용
단계별 준비 과정
대장내시경 전날 투여 방법

전날 오후/초저녁

오후 4-6시 사이



40 온스(5컵)의 맑은 음료를 마십니다.*
 다음 5시간에 걸쳐 음료를 모두 마십니다.

전날 저녁

오후 10시~오전 12시 사이



최소 24 온스(3컵)의 맑은 음료를 다음 5시간에 걸쳐 마십니다.
 대장내시경 2시간 전 또는 의사가 지시한 시간까지 음료를 모두 마십시오.



수분 섭취는 중요하며 준비 과정의 일부입니다. 대장내시경 준비 전, 준비 중 및 준비 후에
 수분을 충분히 섭취하십시오.

준비 과정 보조 도구 준비 과정 보조 도구를 준비 과정 완료 가이드로 사용하십시오.

귀하의 대장내시경 일시는 다음과 같습니다. _____ / _____ / _____

귀하는 절차 당일 _____ 까지 맑은 음료로 계속 수분을 섭취할 수 있습니다.

대장내시경 전일 오후/초저녁
 오후 4-6시

대장내시경 전날에는,
 모든 고형식 및 유제품
 섭취를 중단하고 맑은
 음료로 수분 공급을
 시작하십시오.

- CLENPIQ 1병 마시기
 CLENPIQ을 약병에 든 상태로 마십니다.
 이후 계속 수분을 섭취합니다
 5컵(각 8 온스)의 맑은 음료를 마십니다.
 음료를 마실 때마다 아래의 컵에 체크하십시오!



시작: _____ : _____

완료: _____ : _____

대장내시경 전날 저녁
 오후 10시~오전 12시

- CLENPIQ 나머지 1병 마시기
 CLENPIQ을 약병에 든 상태로 마십니다.
 이후 계속 수분을 섭취합니다
 최소 3컵(각 8 온스)의 맑은 음료를 마십니다.
 음료를 마실 때마다 아래의 컵에 체크하십시오!



시작: _____ : _____

완료: _____ : _____

*초회 복용 후에 심한 평만, 부종 또는 복통이 발생하는 경우, 증상이 해소될 때까지 두 번째 복용을 연기하십시오.
 CLENPIQ, 맑은 유동식 및 수분 공급의 중요성에 대한 상세한 정보는 뒷면을 참조하십시오.

적용증

CLENPIQ은 대장내시경 이전에 대장을 비워 주는 성인용 처방약입니다. CLENPIQ은 설사를 유도하여 대장을 비워 줍니다. 대장을 비움으로써 대장내시경 시 의료 서비스 제공자가 귀하의 대장 내부를 더 명확하게 관찰할 수 있습니다.

중요 안전성 정보

- 의료 서비스 제공자가 귀하에게 중대한 신장 문제, 장 폐색(장 폐쇄), 위 또는 장 복벽의 구멍 뚫림(장 천공), 매우 확장된 장(독성 거대결장), 위장의 음식 및 액체 배출 문제(위 정체) 또는 CLENPIQ의 어느 성분에든 알러지가 있다고 말한 경우, CLENPIQ를 복용하지 마십시오.
- CLENPIQ 및 기타 장 정결은 중대한 체액 상실(탈수) 및 혈중 염분(전해질) 변화를 비롯한 중대한 부작용을 초래할 수 있습니다. 이러한 변화는 심박 이상을 초래하며, 이는 사망, 발작(이전에 발작을 경험하지 않은 경우에도 발생할 수 있음) 또는 신장 문제로 이어질 수 있습니다. 심장 문제, 신장 문제가 있거나 이뇨제 또는 비스테로이드성 소염제(non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDS)를 복용하는 경우 CLENPIQ로 인한 체액 상실 및 혈중 염분 변화 가능성이 보다 높습니다.

전체 중요한 안전성 정보는 뒷면을 참조하십시오.



CLENPIQ™

(sodium picosulfate, magnesium oxide,
and anhydrous citric acid) Oral Solution
10 mg/3.5 g/12 g per 160 mL bottle

준비 과정의 시작부터 완료까지

CLENPIQ이란 무엇인가요?

CLENPIQ은 대장을 비워 주는 처방약입니다.

CLENPIQ은 약병에 든 상태로 바로 마실 수 있습니다. 혼합하거나 희석할 필요가 없습니다.
CLENPIQ을 냉장 또는 냉동 보관하지 마십시오.

CLENPIQ 상자는 어떻게 구성되어 있나요?



CLENPIQ 2병
(각 5.4 온스)



맑은 음료 섭취용 8 온스 컵 1개



참고용 환자 복약지도 및 사용 지침

CLENPIQ 약병 열기



약병을 평평한 바닥에 놓습니다. 뚜껑을 왼쪽(반시계 방향)으로 돌리면서 뚜껑을 누릅니다.
뚜껑 아래 부분의 흰색 플라스틱 고리가 끊어질 때까지 뚜껑을 돌립니다.

수분 섭취 시작하기

대장내시경 전날에는 맑은 음료만 섭취하여 수분 공급을 시작하고 모든 고형식 및 유제품 섭취를 중단하십시오.

대장내시경 준비 전, 준비 중 및 준비 후에 수분을 충분히 공급하는 것이 중요합니다.
의사의 지침을 철저히 따르십시오.

수분 섭취용으로 허용되는 맑은 음료

물	진저에일 및 기타 탄산음료
블랙 커피 또는 차	사과 주스 또는 백포도 주스 등의 맑은 주스
맑은 수프 또는 장국	무향 젤라틴
스포츠 드링크	하드 아이스크림



음료는 붉은색이나 보라색이어서는 안 됩니다. 알코올, 과육 주스, 우유, 크림, 두유 또는 비유제품 크림, 기타 불투명한 음료는 섭취하지 마십시오.

준비 되셨습니까? 이 동영상이 도움이 될 수 있습니다. www.CLENPIQ.com에서 동영상에 따라 수분을 섭취하십시오.

중요한 안전성 정보(계속)

- 귀하가 CLENPIQ을 복용한 후, 귀하의 의료 서비스 제공자가 혈증 변화를 확인하기 위해 혈액 검사를 실시할 수 있습니다. 지나친 체액 손실(탈수)로 인한 일체의 다음 증상(구토, 메스꺼움, 팽만감, 어지러움, 복부 경련통, 평소보다 적은 소변 횟수, 맑은 음료를 마시기 어려움, 삼키기 어려움, 발작 또는 심장 문제)을 경험하는 경우, 즉시 의료 서비스 제공자에게 알리십시오.
- CLENPIQ은 장 궤양 또는 장 문제(허혈결장염)를 유발할 수 있습니다. 심한 복부 통증 또는 직장 출혈이 있는 경우 즉시 의료 서비스 제공자에게 알리십시오.
- CLENPIQ의 가장 흔한 부작용에는 메스꺼움, 두통, 구토가 있습니다. 그 외에도 CLENPIQ의 다른 부작용이 있을 수 있습니다. 자세한 정보는 담당 의사 또는 약사에게 문의하십시오.

전문의약품의 부작용은 FDA에 보고하실 것을 권장합니다. www.fda.gov/medwatch 사이트를 방문하시거나 1-800-FDA-1088번으로 전화하십시오.

복약지도를 포함하여 동봉된 전체 처방 정보를 참조하십시오. www.CLENPIQ.com에서도 확인하실 수 있습니다.