


**CLENPIQ™**  
(sodium picosulfate, magnesium oxide,  
and anhydrous citric acid) Oral Solution  
10 mg/3.5 g/12 g per 360 mL bottle

**ПРИЕМ CLENPIQ**  
**ШАГИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПОДГОТОВКИ**  
Режим дробной дозы


**Вечер накануне**  
Между 17.00 и 21.00



Выпейте не менее 1200 мл (5 чашек) прозрачных жидкостей.\*  
Вы должны это сделать в течение последующих 5 часов.

**Утро**

За 5 часов до процедуры



Выпейте не менее 700 мл (3 чашки) прозрачных жидкостей.  
Прием жидкости должен быть завершен за 2 часа до колоноскопии  
или согласно рекомендации врача.



Гидратация имеет важное значение и является частью подготовки.  
Убедитесь, что Вы провели гидратацию перед приемом готового раствора,  
во время приема готового раствора и после приема готового раствора.

**Помощник по подготовке** Используйте помощник по подготовке как руководство по завершению подготовки.

Время Вашей колоноскопии – \_\_\_\_\_

Завершите подготовку и весь объем гидратации к \_\_\_\_\_

**Вечер накануне колоноскопии**

**В ДЕНЬ НАКАНУНЕ  
КОЛОНОСКОПИИ  
не употребляйте  
твердую пищу и  
молочные продукты  
и начинайте  
гидратацию, выпивая  
прозрачные  
жидкости.**



Выпейте один флакон CLENPIQ  
Пейте CLENPIQ непосредственно из флакона

После этого продолжайте гидратацию  
Выпейте 5 чашек (по 240 мл) прозрачных жидкостей.  
*Отмечайте выпитые чашки!*



Начало: \_\_\_\_\_

Конец: \_\_\_\_\_

**Утро в день колоноскопии**

Выпейте второй флакон CLENPIQ  
Пейте CLENPIQ непосредственно из флакона

После этого продолжайте гидратацию  
Выпейте не менее 3 чашек  
(по 240 мл) прозрачных жидкостей.  
*Отмечайте выпитые чашки!*



ИЛИ БОЛЕЕ

Начало: \_\_\_\_\_

Конец: \_\_\_\_\_

\*Если после приема первой дозы наблюдается сильный метеоризм, отеки или появляется боль в животе, отложите прием второй дозы до исчезновения симптомов.  
Дополнительную информацию о CLENPIQ, важности приема прозрачных жидкостей и гидратации можно найти на обороте.

**ПОКАЗАНИЯ**

CLENPIQ – это рецептурный препарат, который применяется у взрослых для очищения толстой кишки перед колоноскопией. CLENPIQ очищает толстую кишку, вызывая диарею. Очищение толстой кишки поможет медицинскому работнику во время колоноскопии увидеть ее внутреннюю поверхность более четко.

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

- Не принимайте CLENPIQ, если медицинский работник сказал Вам, что у Вас серьезные проблемы с почками, кишечная непроходимость (закупорка толстой кишки), прободение стенки желудка или кишки (перфорация толстой кишки), аномальное увеличение кишки (токсический мегаколон), проблемы с эвакуацией пищи и жидкости из желудка (застой в желудке) или аллергия на любой из компонентов CLENPIQ.
- CLENPIQ и другие препараты для толстой кишки могут приводить к серьезной потере жидкостей организма (дегидратации) и изменениям в солевом составе крови (электролиты). Эти изменения, в свою очередь, могут вызывать отклонения сердечного ритма, которые могут закончиться смертью, судорогами (это может случиться, даже если до этого судорог у Вас никогда не было) или проблемами со стороны почек. Вероятность потери жидкости организмом и развития изменений в солевом составе крови при приеме CLENPIQ выше, если у Вас есть проблемы с сердцем, почками или Вы принимаете мочегонные препараты либо нестероидные противовоспалительные средства (НПВС).

Дополнительную информацию, касающуюся безопасности, можно найти на обороте.



## CLENPIQ™

(sodium picosulfate, magnesium oxide,  
and anhydrous citric acid) Oral Solution  
10 mg/3.5 g/12 g per 160 mL bottle

# ПРИГОТОВИТЬСЯ, НАЧАТЬ, ЗАВЕРШИТЬ ПРИЕМ ПРЕПАРАТА

### Что представляет собой CLENPIQ?

CLENPIQ – это рецептурный препарат для очищения толстой кишки.  
CLENPIQ готов к применению – его можно пить непосредственно из флакона. Его не надо смешивать или разводить.  
Не замораживайте CLENPIQ и не храните его в холодильнике.

### Что внутри упаковки CLENPIQ?



Два флакона CLENPIQ  
(по 160 мл каждый)



Мерный стакан объемом  
240 мл для приема  
прозрачных жидкостей



Руководство по применению  
препарата для пациента

### Чтобы открыть флакон CLENPIQ,



поставьте его на плоскую поверхность. **Надавите на колпачок, одновременно поворачивая его влево** (против часовой стрелки). Поворачивайте колпачок до тех пор, пока Вы не увидите, что пластиковое кольцо под ним разорвалось.

### Начинайте гидратацию

Начинайте гидратацию в день накануне колоноскопии, принимая прозрачные жидкости, и прекратите прием твердой пищи и молочных продуктов.

Убедитесь, что Вы провели гидратацию перед приемом готового раствора, во время приема готового раствора и после приема готового раствора. **Неукоснительно соблюдайте инструкции, которые дает Вам врач.**

#### ПРОЗРАЧНЫЕ ЖИДКОСТИ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАТАЦИИ

Вода	Имбирный эль и другие газированные напитки
Черный кофе или чай	Прозрачные соки, например, яблочный сок или сок из белого винограда
Прозрачный бульон или бульон	Простое желе Jell-O
Спортивные напитки	Замороженные соки



**ЖИДКОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КРАСНОГО ИЛИ ЛИЛОВОГО ЦВЕТА. НЕ ПЕЙТЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОК С МЯКОТЬЮ, МОЛОКО, СЛИВКИ, СОЕВЫЙ ИЛИ НЕМОЛОЧНЫЙ ЗАБЕЛИВАТЕЛЬ ИЛИ ДРУГИЕ НЕПРОЗРАЧНЫЕ ЖИДКОСТИ.**

**На старт. Внимание. Это видео может помочь Вам подготовиться. Проводите гидратацию вместе с [www.CLENPIQ.com](http://www.CLENPIQ.com)**

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- После приема CLENPIQ медицинский работник может сделать Вам анализы крови, чтобы проверить, нет ли в ней изменений. Немедленно скажите медицинскому работнику, если у Вас появились следующие симптомы, вызванные чрезмерной потерей жидкости (дегидратацией): рвота, тошнота, вздутие кишечника, головокружение, схваткообразные боли в области живота, более редкое и скудное мочеиспускание, затруднения при приеме прозрачных жидкостей, затруднения при глотании, судороги или проблемы со стороны сердца.
- CLENPIQ может вызывать язвы толстой кишки или проблемы с толстой кишкой (ишемический колит). Немедленно скажите медицинскому работнику, если у Вас появились сильные боли в животе или кровотечение из прямой кишки.
- К наиболее частым побочным эффектам CLENPIQ относятся тошнота, головная боль и рвота. Это не все возможные побочные эффекты CLENPIQ. Более подробную информацию Вы можете узнать у врача или фармацевта.

Настоятельно рекомендуется сообщать о любых негативных побочных явлениях, связанных с рецептурными препаратами, в FDA. Посетите сайт [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch) или позвоните по номеру 1-800-FDA-1088.

Ознакомьтесь с прилагаемой дополнительной информацией по применению препарата и Руководством для пациента или посетите страницу [www.CLENPIQ.com](http://www.CLENPIQ.com).