

Ivan Friedrich, M.D.
Kenneth P. Rubin, M.D.
Vincent S. Panella, M.D.
Mark S. Sapienza, M.D.
Irina Kaplounov, M.D.

Diplomates, American Board of Gastroenterology and Internal Medicine
420 Grand Avenue
4Englewood, N.J. 07631
(201)569-7044

СУПРУП Колоноскопия Инструкция
SuPrep Colonoscopy Prep

Фамилия,Имя: _____ Врач: _____

Дата: _____ Время: _____ Время прибытия: _____

Место: _____ Обратиться к: _____

Если Вам необходимо отменить процедуру, сделайте это за 24 часа. В противном случае Вам придет билл на \$100!

1. Купите **SuPrep** по рецепту и держите под рукой раствор за день до процедуры.

2. **За день до начала процедуры начинается диета прозрачных жидкостей**, если нет других указаний врача. Прозрачными жидкостями являются: вода, прозрачный бульон, прозрачные соки, черный чай или черный кофе, желе и леденцы. Прозрачными жидкостями -означает, что вы можете видеть сквозь жидкость в зеркало. **Ничего красного цвета. Нельзя твердую пищу в течение всего дня до процедуры!**

3. **В 6 вечера за день до процедуры**, разведите питьевой водой 1 бутылку **SuPrep** в одноразовой таре. Завершить весь контейнер. Затем пейте 4 стакана (1 литр или 16 унций) питьевой воды. Повторите эту процедуру утром за 6 часов до начала теста.

4. После завершения раствора , продолжайте диету прозрачных жидкостей за 4 часа до процедуры. Ваш желудок должен быть совершенно пустой в течение 4 часов перед процедурой в целях безопасности анестезии. **Если вы не будете следовать этим направлениям правильно, процедура может быть отменена.** Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, позвоните в офис, чтобы убедиться, что вы готовитесь к Вашей процедуре правильно.

5. Пожалуйста, примите ваши лекарства для сердца и давления ранним утром с глотком воды. Если вы диабетик на инсулине, обратитесь к врачу для конкретных инструкций по дозировке лекарства. Пожалуйста, воздержитесь от принятия каких-либо таблеток и витаминов содержащие железо в течение 5 дней до процедуры. Если у вас есть сомнения по поводу того, не содержит ли железа таблетки и витамины , не принимайте их. **Аспирин, Плавикс, Coumadin** или разжижающие кровь средства также должны быть исключены в течение 5 дней до процедуры. Для пациентов, принимающих эти виды лекарств, проконсультируйтесь с врачом и кардиологом . **Tylenol** является безопасным для использования в качестве обезболивающего.

6. Пожалуйста, организуйте поездку домой в день вашей процедуры, так как вы не сможете ездить в течение 24 часов после процедуры. Весь процесс от прибытия до отъезда занимает около 2 часов. **Вы не должны приносить с собой ценности, мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб Ваших ценностей.** Вы должны взять с собой ваши страховые карточки, удостоверение личности с фотографией, и любой со-рау, сострахования или вычета суммы во время вашей процедуры, если меры были приняты заранее. Есть небольшие шкафчики для хранения ваших личных вещей.